



## Інструкція з використання комплексу

Облаштування присадибної ділянки – кропітка справа, яка вимагає багато часу та сил. Тож ми вирішили спростити цей процес, аби ви могли приділяти якомога більше уваги дійсно важливим речам.

В наборі ви знайдете готовий комплекс, який забезпечить декоративним культурам на вашій ділянці належний захист і збалансоване живлення.

Насолоджуйтесь життям, а про ваші рослини подбає **GreenBox**.

# Комплекс для захисту декоративних хвойних та листяних культур від шкідників і хвороб



| Культура                                  | Кількість дерев/кущів | Проблема (від чого захищає)   | Рішення (препарат)              | Приготування робочого розчину   | Норма витрати робочого розчину* | Спосіб, час обробки  |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Хвойні насадження                         | 5 дерев               | Шкідники: личинки хрущів, дротяники, несправжні дротяники, гусениці підгризаючих совок, ведмедка  | Антихруц                        | 2 пакети (20 мл) на 10 л води   | 2 л на дерево                   | Проливання в період вегетації за допомогою садової лійки за появи шкідників. Перед обробкою пролити прикореневу зону рослин звичайною водою. За потреби, можна збільшити норму витрати води так, щоб внести 20 мл препарату на 5 дерев |
|   |                       | Шкідники: трипси, совки, попелиці, щитівка (у фазі «бродяжки»), клопи, рудий сосновий пильщик, туєва міль. Нестача елементів живлення (добриво) | Гудвін + Авангард Гроу Аміно    | 2 бінарних комплекти (10 мл + 20 мл) на 18–20 л води                                | 3 л на дерево                   | Обприскування в період вегетації за появи шкідників та для підживлення культур   |
|   |                       |   | Ато Жук + Авангард Стимул       | 2 бінарних комплекти (6 мл + 20 мл) на 16 л води                                    |                                 |  |
|   |                       | Шкідники: кліщі (види)  | Ескаліп                         | 2 пакети (15 мл) на 16 л води   | 3 л на дерево                   | Обприскування в період вегетації за прояву шкідників   |
|   |                       | Хвороби: шютте (звичайне, сніжне)   | Гарт                            | 2 пакети (60 г) на 15 л води  |                                 |  |
|   |                       | Хвороби: шютте звичайне, сніжне, склерофомоз, склеродеріоз, трахеомікозне в'янення (фузаріоз), диплодіоз  | Сільвер                         | 2 пакети (60 мл) на 20 л води   |                                 |  |
| Несприятливі для обробки умови (прилипач) | Тандем                | 2 пакети (20 мл) на 20 л води   | Залежно від основного препарату | Додавання під час обприскування до робочого розчину засобів захисту рослин і добрив |                                 |  |

## Комплекс для захисту декоративних хвойних та листяних культур від шкідників і хвороб



| Культура           | Кількість дерев/кущів | Проблема (від чого захищає)   | Рішення (препарат)           | Приготування робочого розчину                | Норма витрати робочого розчину* | Спосіб, час обробки  |
|--------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Листяні насадження | 2-3 дерева і 5 кущів  | Шкідники: личинки хрущів, дротяники, несправжні дротяники, гусениці підгризаючих совок, ведмедка                                | Антихрущ                     | 2 пакети (20 мл) на 10 л води                | 2 л на дерево;<br>1 л на кущ    | Проливання в період вегетації за допомогою садової лійки за появи шкідників. Перед обробкою пролити прикореневу зону рослин звичайною водою. За потреби, можна збільшити норму витрати води так, щоб внести 20 мл препарату на вказану кількість дерев і кущів |
|                    |                       | Шкідники: трипси, совки, попелиці, щитівка (у фазі «бродяжки»), клопи, самшитова вогнівка. Нестача елементів живлення (добриво) | Гудвін + Авангард Гроу Аміно | 1 бінарний комплект (5 + 10 мл) на 10 л води |                                 | Обприскування в період вегетації за появи шкідників та для підживлення культур   |
|                    |                       | Шкідники: кліщі (види)  | Ескаліп                      | 2 пакети (15 мл) на 16 л води                | 3 л на дерево;<br>1,5 л на кущ  | Обприскування в період вегетації за появи шкідників  |
|                    |                       | Шкідники: попелиці, листогризучі совки. Хвороби: борошниста роса, септоріоз, церкоспоров  | Антигусінь + Самшит          | 2 бінарних комплекти (8 + 6 мл) на 16 л води | 3 л на дерево;<br>1,5 л на кущ  | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву шкідливих організмів)  |
|                    |                       | Хвороби: антракноз, профілактика бактеріальних хвороб   | Гарт                         | 2 пакети (60 г) на 15-20 л води              | 3 л на дерево;<br>1,5 л на кущ  | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)  |
|                    |                       | Несприятливі для обробки умови (прилипач)   | Тандем                       | 2 пакети (20 мл) на 20 л води                | Залежно від основного препарату | Додавання під час обприскування до робочого розчину засобів захисту рослин і добрив  |

\* За середньої висоти дерева 1.8 м та діаметра куща 1.5 м.

Препарати можна застосовувати окремо або ж комбінуючи, залежно від появи шкідливих організмів.

Детальну інформацію по кожному із препаратів можна знайти на сайті: [apteka-sadivnyuka.ua](http://apteka-sadivnyuka.ua)

## Приготування, застосування робочого розчину



Взяти розрахункову кількість препарату (див. табл.)



Розчинити у воді (див. табл.) і ретельно перемішати



Робочий розчин залити до садової лійки чи ранцевого обприскувача та почати обробку



Отримати результат

Необхідну кількість препаратів по чергово додати в бак ранцевого обприскувача, заповнений на 1/3 чистою водою, постійно розмішуючи, через декілька хвилин долити воду до повного об'єму бака, ретельно розмішати. Робочий розчин готувати безпосередньо перед обробкою, використовувати в день приготування. Обробку проводити при мінімальній швидкості вітру (<3-4 м/с) за температури повітря не вище +25°C. Під час обприскування необхідно забезпечити рівномірне покриття розчином листків та стебел рослин без стікання з обробленої поверхні.

**До відома споживача.** Виробник і постачальник препарату не несуть відповідальності за збитки, спричинені порушенням вимог інструкції з використання, недотриманням технології обробки, несприятливими погодними умовами тощо. При використанні препарату дотримуватись регламентів безпечного застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема ст. 87 Водного кодексу України (не ближче 2 км до існуючих берегів рибогосподарчих водойм і річок) та регламенту застосування пестицидів 1-го класу небезпеки для бджіл (використовувати при швидкості вітру <1-2 м/с, захисна зона для бджіл – 4-5 км та обмеження їх льоту – 4-5 діб).

**Застережні заходи.** Під час роботи із засобами категорично забороняється вживати їжу, пити та палити. Уникати потрапляння препарату або його розчину на шкіру, в очі, до шлунку. Не вдихати розпил препарату. Під час роботи користуватись засобами індивідуального захисту шкірного покриву, очей та органів дихання (спецодяг, рукавиці, захисні окуляри, респіратор тощо). Не застосовувати препарат поблизу колодязів та інших джерел децентралізованого водопостачання і водойм. По закінченні робіт з препаратом слід відразу прийняти душ і змінити одяг. Дотримуватись заходів безпеки. Не використовувати порожнє пакування з-під препаратів повторно для будь-яких цілей.

**Токсичність.** Класифікація ВООЗ: 2-4 клас небезпечності, залежно від препарату (ДСанПіН 8.8.1.2.002-98).

**Утилізація.** Обприскувачі, використані ємності по закінченні робіт промити водою. Промивні води злити у компостну яму глибиною не менше 1 м. Порожню упаковку помістити в сміттєвий контейнер для збору і видалення відходів.

**Перша медична допомога.** При появі перших симптомів інтоксикації (головний біль, нудота, слабкість тощо) вивести потерпілого із зони забруднення та забезпечити йому вільне дихання. При попаданні препарату: на шкіру – ретельно видалити речовину марлевим тампоном, промити великою кількістю проточної води; в очі – негайно промити їх великою кількістю проточної води; до шлунку – випити декілька склянок води, краще теплої, штучно викликати блювання. Повторити процедуру 2-3 рази для повного видалення препарату зі шлунку. Потім дати випити потерпілому склянку води з розчиненими в ній 4-5 пігулками карболену або активованим вугіллям (2 ст. ложки на склянку води), використати сольове послаблююче (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на ½ склянки води). Після надання першої медичної допомоги звернутись до лікаря.

#### **Антидот невідомий.**

**Вимоги до зберігання.** Зберігати в закритій непошкодженій упаковці виробника в сухому провітрюваному місці (господарські приміщення), недоступному для дітей і тварин, окремо від харчових продуктів, миючих засобів, медикаментів та кормів при температурі від 0°C до +30°C.

**Гарантійний строк придатності:** 4 роки з дати виробництва.

**Дата виробництва:** див. на коробці.

Ми в     @aptekasadivnyka

**Приєднуйтесь!**

**ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**

**Виробник:** ТОВ «Укравіт Сайенс Парк»  
Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Сурикова, 9, 11/1  
Гаряча лінія: 0 800 301 401

